

VACCINATION AF BØRN MOD INFLUENZA .

Vaccination mod influenza til børn gives som en næsespray, der sprøjtes op i hvert næsebor.

Denne vaccine er specielt udviklet og godkendt til børn.

Vaccination skal gives 2 gange med min. 4 ugers interval.

De hyppigste bivirkninger er milde og varer ikke længe.

Det kan være tilstoppet eller løbende næse, hovedpine, feber, muskelsmerter og nedsat appetit.

Risikoen for alvorlige bivirkninger, såsom allergiske reaktioner er meget lille og på niveau med andre børnevaccinationer.

Efter vaccination anbefales barnet at vente 15 min. i venteværelset med henblik på observation af allergisk reaktion

Vaccinen er en såkaldt levende, svækket vaccine, ligesom vi kender det fra MFR -vaccinen. Levende svækkede vacciner indeholder hele viruspartikler - i dette tilfælde viruspartikler fra 4 forskellige influenzastammer, der er behandlet, sådan at de ikke kan give sygdom hos raske personer.

Hos personer med svært nedsat immunforsvar kan levende svækkede vacciner dog i sjældne tilfælde forårsage infektion. Derfor skal de have en anden type vaccine.

Vaccinen bør derfor ikke gives til børn med alvorligt svækket immunforsvar (f.eks. børn med akut leukæmi), eller børn, der behandles med immunhæmmende medicin (f.eks. højdosis kortikosteroider) eller salicylater .

Desuden bør den ikke gives til børn med svær astma eller kompromitteret vejtrækning.

Hvis der i nærmeste familie er personer med nedsat immunforsvar (søskende , forældre , bedsteforældre) bør barnet ikke vaccineres med denne vaccine. Hvis barnet alligevel vaccineres bør tæt kontakt undgås i 1-2 uger efter vaccination.

Denne vaccine må ikke gives til børn, der er allergiske over gentamicin (en type antibiotica) eller for æg eller æggeproteiner .